




AT

PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : A61K 47/48	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/14215 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. April 1998 (09.04.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/05389 (22) Internationales Anmeldedatum: 1. Oktober 1997 (01.10.97) (30) Prioritätsdaten: 196 40 791.5 2. Oktober 1996 (02.10.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SYN- TESOME GESELLSCHAFT FÜR MED. BIOCHEMIE M.B.H. [DE/DE]; Heimdallstrasse 4, D-81739 München (DE). (71)(72) Anmelder und Erfinder: BOVIN, Nikolai [RU/RU]; Artsimovicha strasse 11-181, Moscow, 117871 (RU). MATROSOVICH, Mikhail [RU/RU]; Ramenka strasse 9/2-287, Moscow, 117607 (RU). TUZIKOV, Alexandr [RU/RU]; Ismaylowski strasse 47-4, Moscow, 105037 (RU). CHINAREV, Alexandr [RU/RU]; Miklukho-Maklaya strasse 16/10, Moscow, 117871 (RU). GAMBARYAN, Alexandra [RU/RU]; Vargy strasse 40-71, Moscow, 117133 (RU). ROBERTSON, James [GB/GB]; Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire EN6 3QG (GB).		(74) Gemeinsamer Vertreter: SYNTESOME GESELLSCHAFT FÜR MED. BIOCHEMIE M.B.H.; Heimdallstrasse 4, D-81739 München (DE). (81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>

(54) Title: GLYCOCONJUGATES AS VIRUS CELL ADHESION INHIBITORS

(54) Bezeichnung: GLYCOKONJUGATE ALS INHIBITOREN DER VIRALEN ZELLADHÄSION



(57) Abstract

The host-cell adhesion by human influenza viruses is inhibited by new compounds of the general formula (1), where R¹ stands for acyl or a thioacyl group; R² for hydroxyl, Z-alkyl, substituted Z-alkyl, Z-aryl, substituted Z-aryl, and Z corresponds to O, S or NH; R³ stands for an acyl or a thioacyl group; R⁴ for H or acyl; X for O, S, SH₂ or a sugar; and where W is a bifunctional spacer and P a multivalent vector consisting of one of the following substances: polyacrylate, polyacrylamide, N-substituted polyacrylamide, metacrylamide, N-substituted metacrylamide, polyacrylic acid, polycarbonate, polyester, polyamide, polyanhydride, polyiminocarbonate, polyorthoester, polydioxanone, polyphosphazene, polyhydroxy carboxylic acid, polyamino acid, polysaccharide, protein, dextran, chitosan, glucan, liposome, microparticles. The inventive compounds are capable of bonding authentic human viruses from the A (H1 and H3) groups, which have not been adapted through culturing in chicken eggs.

(57) Zusammenfassung

Die Adhäsion menschlicher Influenza Viren an Wirtszellen wird durch neue Verbindungen der allgemeinen Formel (1) inhibiert worin, R¹ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet; R² H, Hydroxyl, Z-Alkyl, substituiertes Z-Alkyl, Z-Aryl, substituiertes Z-Aryl bedeutet, und Z O, S oder NH entspricht; R³ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet; R⁴ H oder Acyl darstellt; X O, S oder ein lineares C₁-C₄ Alkyl bedeutet; Y NH, O, S, CH₂ oder ein Zucker ist; W ein bifunktionseller Spacer ist P ein multivalenter Träger bestehend aus einem der nachfolgenden Stoffe ist: Polyacrylat, Polyacrylamid, N-substituiertes Polyacrylamid, Metacrylamid, N-substituiertes Metacrylamid, Polyacrylsäure, Polycarbonat, Polyester, Polyamid, Polyanhydrid, Polyiminocarbonat, Polyorthoester, Polydioxanon, Polyphosphazen, Polyhydroxycarbonsäure, Polyaminosäure, Polysaccharid, Protein, Dextran, Chitosan, Glucan, Liposom, Micropartikel. Die neuen Verbindungen binden authentische, nicht durch Anzucht in Hühnereiern adaptierte menschliche Viren der Typen A (H1 und H3) und B.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Glykokonjugate als Inhibitoren der viralen Zelladhäsion**Beschreibung**

5 Die vorliegende Erfindung betrifft neue multivalente Derivate von Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc und die Herstellung dieser Verbindungen. Sie betrifft weiterhin die Verwendung dieser Verbindungen als Inhibitoren der viralen Zelladhäsion nicht-adaptierter menschlicher Influenza Viren.

Der erste essentielle Schritt einer viralen Infektion besteht in der Adhäsion eines
10 Virus an die Oberfläche der Wirtszelle. Im Falle von Influenza Viren der Typen A und B, geschieht dies über die Bindung des viralen Hemagglutinins(HA) an terminale Sialyloligosaccharide von Glycoproteinen und Glycolipiden auf der Zelloberfläche der Wirtszelle. Eine mögliche Strategie zur Verhinderung von Influenza Infektionen besteht in der Verwendung von Inhibitoren der Zelladhäsion, diese sollen sich mit den viralen
15 Hemagglutininen verbinden und deren Reaktion mit den Wirtszellen hemmen.

In der Literatur sind bereits eine Reihe von Inhibitoren der Adhäsion von Influenza Viren bekannt. Insbesondere durch die Entwicklung von multivalenten Verbindungen konnten einige Inhibitoren gefunden werden, welche jeweils die Adhäsion eines bestimmten Influenza Stammes in einem in-vitro Test erfolgreich
20 verhindern (siehe Tabelle 2).

Ein Nachteil dieser bekannten Inhibitoren liegt in ihrem engen Wirkungsspektrum, die Verbindung zeigen jeweils nur gegen einen einzigen Stamm hohe Aktivität und sind somit für eine praktische prophylaktische oder therapeutische Anwendungen nur wenig geeignet.

25 Ein weiterer Nachteil ist, daß die Aktivität dieser bekannten Inhibitoren jeweils nur gegenüber adaptierten Influenza Stämmen gezeigt wurde, welche auf embryonalen Hühnereiern angezogen worden sind. Es ist bekannt, daß die Anzucht menschlicher Influenza Viren auf Hühnereiern zu Aminosäure Mutationen in der Region der Rezeptorbindestelle des Hemagglutinins führt (Robertson, 1993). Die auf diese Weise
30 gefundenen Inhibitoren haben zwar eine hohe Affinität zu den veränderten Hemagglutininen dieser mutierten Viren, während ihre Aktivität gegenüber Wild-Typ


Hemagglutin in vielen Fällen geringer ist (siehe polymeres Sialosid BGN-PAA in Tabelle 1).

- 5 Aufgabe dieser Erfindung war es neue Inhibitoren der viralen Zelladhäsion von menschlichen Influenza Viren zu finden. Diese Inhibitoren sollten ein breites Wirkungsspektrum gegen Influenza Wild-Typ Stämme haben und hierbei eine möglichst hohe inhibitorische Aktivität besitzen.

Es wurde nun gefunden, daß multivalente Konjugate des Sialosidliganden Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc (6'-Sialyl-N-acetyllactosamine, 6SLN) neue, hoch aktive Inhibitoren der viralen Zelladhäsion sind.

10

Gegenstand der Erfindung sind Verbindungen der Formel I



- worin R¹ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet, vorzugsweise eine Acetyl-, Thioacetyl-, Propionyl oder Thiopropionylgruppe ist; R² H, Hydroxyl, Z-Alkyl, substituiertes Z-Alkyl, Z-Aryl, substituiertes Z-Aryl bedeutet, und Z O, S oder NH entspricht; R³ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet; R⁴ H oder Acyl darstellt; X O, S oder ein lineares C₁-C₄ Alkyl bedeutet; Y NH, O, S, CH₂, oder ein Zucker ist; W ein bifunktionaler Spacer ist;
- 15 P ein multivalenter Träger bestehend aus einem der nachfolgenden Stoffe ist: Polyacrylat, Polyacrylamid, N-substituiertes Polyacrylamid, Metacrylamid, N-substituiertes Metacrylamid, Polyacrylsäure, Polycarbonat, Polyester, Polyamid, Polyanhydrid, Polyiminocarbonat, Polyorthoester, Polydioxanon, Polyphosphazen,
- 20

Polyhydroxycarbonsäure, Polyaminosäure, Polysaccharid, Protein, Dextran, Chitosan, Glucan, Liposom, Micropartikel.

P kann auch einen niedermolekularen multivalenten Träger wie $C(CH_2NH-A_n)_4$ sein, worin A eine neutrale oder negativ geladene Aminosäure ist.

- 5 Überraschenderweise zeigte sich auch, daß Verbindungen der Formel I die Zelladhäsion aller bekannter menschlicher Influenza Stämme der Typen A und B sehr effizient inhibieren. Insbesondere sind diese Inhibitoren aktiv gegen authentische, in der Struktur der Rezeptorbindestelle des Hemagglutins nicht veränderte Influenza Viren. Um eine unveränderte Struktur der Rezeptorbindestelle des Hemagglutinins zu
- 10 gewährleisten, wurden Influenza Viren aus klinischen Isolaten verwendet, welche ausschließlich auf MDCK-Zellen (Madin-Derby canine kidney cells) angezogen worden sind. Wie ein mittels PCR durchgeführter Vergleich der viralen RNA-Sequenzen auf MDCK gezogener Viren mit den RNA-Sequenzen von Viren aus klinischen Isolaten gezeigt hat, weisen die auf MDCK gezogene Viren keine Mutationen in der Region der
- 15 Rezeptorbindestelle des Hemagglutinins auf (Robertson, 1993). Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der Inhibition der viralen Zelladhäsion durch die neue Verbindung 6SLN-PAA und durch das Glycokonjugat BGN-PAA, welches bereits früher gegen auf Hühnereiern angezogene Stämme des Typs H3N2 A/Sichuan/1/87 entwickelt wurde. Während die Verbindung 6SLN-PAA ein hervorragender Inhibitor aller
- 20 authentischer Influenza Stämme ist, hat BGN-PAA ein engeres Wirkungsspektrum, und hat gegen viele Stämme nur eine sehr geringe Aktivität. Die Vorteile der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I liegen insbesondere in ihrem Wirkungsspektrum als Inhibitoren der viralen Zelladhäsion aller bekannter menschlicher Influenza Viren der Typen A und B, und in den sich daraus eröffnenden
- 25 Möglichkeiten diese Verbindungen zu prophylaktischen und therapeutischen Zwecken gegen Influenza Infektionen einzusetzen. Ein weiterer Vorteil liegt in der leichten Zugänglichkeit von Derivaten der Verbindungen der Formel I, welche einen zusätzlichen Marker tragen, geeignete Marker sind z. B. Biotin, Farbstoffe, Fluoreszenzfarbstoffe oder radioaktive Marker. Diese Derivate
- 30 können verwendet werden als Komponenten für neue, bisher nicht zugängliche Screening Systeme zur Entdeckung neuer Inhibitoren der viralen Zelladhäsion.

Tabelle 1.

- Inhibition der viralen Zelladhäsion von Influenza Viren durch die polymeren Sialoside BGN-PAA and 6SLN-PAA, gemessen mittels Inhibition der viralen Bindung an Fetuin, wie in Beispiel 8 und in Gambaryan and Matrosovich, 1992 beschrieben.
- BGN ist Neu5Ac α 2-OCH₂C₆H₄NHCOCH₂NH-,
 6SLN ist Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NH-.

	I. Klinische Human-Isolate, vermehrt in MDCK Zellen		
	Virus	Affinität der Bindung an Virus, K _{aff} , μ M Neu5Ac	
		BGN-PAA	6SLN-PAA
	H3N2		
	A/NIB/47/89 M	0.03	0.01
	A/NIB/3/90 M	0.01	0.01
	A/NIB/44/90 M	0.01	0.01
	H1N1		
	A/England/157/83 M	>100	0.03
	A/NIB/12/89 M	>5	0.1
	A/NIB/23/89 M	>5	0.02
	A/NIB/50/89 M	>5	0.02
	B		
	B/England/222/82 M	0.05	0.04
	B/NIB/48/90 M	0.05	0.04
	B/NIB/15/89 M	0.03	0.02
	II. Durch Anzucht in Hühnereiern adaptierte Stämme		
	H3N2		
	X31 (A/Aichi/2/68)	100	3
	A/England/321/77	0.03	0.01
	A/USSR/3/85	0.06	0.1
	A/Sichuan/1/87	0.02	0.1
	H2N2		
	A/England/12/64	10	0.1
	H1N1		
	A/FW/1/50	5	3
	A/USSR/90/77	6	0.3
	A/Chile/1/83	30	6
	B		
	B/USSR/100/83	5	2
	B/Ann Arbor/1/86	>100	3
	B/Yamagata/11/88	>100	100

Die Erfindung wird anhand der Beispiele näher und beispielhaft erläutert.

Beispiel 1.

Herstellung von Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NH₂, (modifizierte Methode
5 nach Likhoshesterov et al., 1986; und Manger et al., 1992)

- Bei Raumtemperatur wurden 13.8 mg 6'-Sialyllactosamine NH₄⁺-Salz (20 μ M, isoliert aus menschlichen Urin) in 1ml gesättigter Ammoniumbicarbonat Lösung gelöst und während 170 h gerührt, während der Inkubation wurde zu der Lösung mehrmals festes
- 10 Ammoniumbicarbonat bis zur Sättigung zugesetzt. Die Reaktionslösung wurde mit 2ml Wasser verdünnt, eingefroren und lyophilisiert. Man erhielt 13.7 mg Rückstand (war das Gewicht des erhaltenen Produktes größer als die eingesetzte Menge Saccharid, so wurde der Rückstand nochmals in 2ml Wasser aufgenommen und lyophilisiert), dieser wurde in 0.6ml 1M NaHCO₃ aufgenommen. Unter Rührung bei 0°C wurden 34 mg
- 15 Chloressigsäureanhydrid (200 μ M) in 0.34ml Ethylacetat zugegeben. Nach 1 h wurde die Lösung mit Essigsäure neutralisiert und im Vakuum eingeeengt. Der erhaltene Rückstand wurde in einer minimalen Menge Wasser aufgelöst und über eine Sephadex G-25 Säule (1x50 cm) chromatographiert. Die zuckerhaltige Fraktion wurde eingeeengt, und der Rückstand in 1 ml gesättigter Ammoniumcarbonat Lösung aufgenommen. Nach
- 20 48 h wurde die Lösung mit 2ml Wasser verdünnt, eingefroren und lyophilisiert. Der Rückstand wurde in 2ml 1% Essigsäure aufgelöst und nach 15 h über eine Säule mit 3ml Dowex AG 50W-X4 (H⁺ Form) gegeben. Die Säule wurde mit 30 ml Wasser gewaschen und dann mit einer 1M Ammoniumhydroxid Lösung eluiert. Nach Einengen des Ammoniumhydroxid Eluats wurden 9.8 mg (67%) des 6'-Sialyllactose N-glycyl
- 25 Derivates erhalten.
- ¹H-NMR-Spektrum (D₂O, δ , ppm): 5.16 (d, 1H, J₂ 9 Hz, H-1 Gal), 4.47 (d, 1H, J₂ 8 Hz, H-1 GlcNAc), 4.00-3.55 (Gal, GlcNAc, Neu5Ac), 3.46 (s, 2H, COCH₂NH₂), 2.69 (dd, 1H, J_{3ax} 12 Hz, J₄ 4.5 Hz, H-3eq Neu5Ac), 2.04 (s, 6H, 2 CH₃CO), 1.72 (dd, 1H, J₄ 12.5 Hz, H-3ax Neu5Ac).

Der Verlauf der Reaktionen wurde mittels Dünnschichtchromatographie verfolgt (Kieselgel 60, Merck):

Eluent 1: 2-Propanol/Aceton/Wasser 4:3:2:

	6'SLN	$R_f =$	0.61	
5	6'SLN-NH ₂	0.49	Ninhydrin positiv	
	6'SLN-NHCOCH ₂ Cl	0.66		
	6'SLN-NHCOCH ₂ NH ₂	0.09	Ninhydrin positiv	

Eluent 2: Methanol/Aceton/Wasser 1:1:1:

10	6'SLN-NHCOCH ₂ NH ₂	0.73	Ninhydrin positiv	
----	---	------	-------------------	--

Beispiel 2

Herstellung von Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NHCO(CH₂)₄COO-p-C₆H₄NO₂

- 15 Bei Raumtemperatur wurden zu einer Lösung von 7.3 mg Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NH₂ (10 μ M) aus Beispiel 1 in 0.2ml DMSO, 39 mg Bis(4-nitrophenyl)-adipat (100 μ M) in 0.6ml DMF zugegeben. Nach 3 h wurde das Reaktionsgemisch über eine Sephadex LH-20 Säule (1.8x30 cm, Eluent - Acetonitril/Wasser 1:1) chromatographiert. Die zuckerhaltige Fraktion wurde eingengt
- 20 in Wasser aufgenommen, eingefroren und lyophilisiert. Man erhielt 7.4 mg des Glykosids(76%).

Beispiel 3

Herstellung von Tetrakis(N-tert-butyloxycarbonyl-glycyl-amidomethyl)methan

25

- Ein Gemisch von 1g Tetrakis(aminomethyl)methan (Fleischer et. al., 1971) tetrahydrochlorid (3.6 mmol), 8.52g BocGlyONph (28.8 mmol) und NEt₃ (2.5ml, 18 mmol) in 2ml DMF wurde 120 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde eingengt, in 100ml Ethylacetat suspendiert, und mit 2%
- 30 H₂SO₄, Wasser, gesättigter NaHCO₃-Lösung und Wasser gewaschen und über Na₂SO₄ getrocknet. Die Lösung wurde eingengt, der Rückstand in Trifluoroethanol

gelöst, ein Gemisch $\text{CHCl}_3/\text{EtOAc}/\text{MeOH}$ (9:3:1) und Et_2O wurde zugegeben. Man erhielt 2.1 g eines kristallinen Produktes (78%).

DC: $R_f=0.5$ in $\text{CHCl}_3/\text{EtOAc}/\text{MeOH}/\text{AcOH}$ 9:3:2:0.2 (Ninhydrin-positiv, nach 5 min Behandlung der Platte mit HCl -Gas).

- 5 ^1H -NMR-Spektrum in D_6 -DMSO (δ , ppm): 7.97 (br t, 1H, CCH_2NH), 7.37 (t, 1H, NH^{Gly}), 3.49 (d, 2H, J_{NH} 6 Hz, CH_2^{Gly}), 2.76 (br d, 2H, CCH_2), 1.37 (s, 9H, OCMe_3).
Massenspektrum: 783 (M+Na).

Beispiel 4

- 10 Herstellung von Tetrakis(N-tert-butyloxycarbonyl-triglycyl-amidomethyl)methan

- Eine Lösung von 0.76g Tetrakis(N-tert-butyloxycarbonyl-glycyl-amidomethyl)-methan (1 mmol) aus Beispiel 3 in 8 ml CF_3COOH wurde 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit 16ml Toluol versetzt und eingengt. Der Rückstand wurde
- 15 in 3 ml Wasser aufgenommen, es wurden 0.35ml konzentrierte HCl (12M) zugegeben, die Lösung wurde eingengt und der Rückstand im Vakuum getrocknet. Das gebildete Tetraamin wurde in 18ml DMF suspendiert, es wurden 1.45g BocGlyGlyONsu (4.4 mmol) und 0,6ml Et_3N zugegeben. Die Reaktionslösung wurde 24 h bei
- 20 Raumtemperatur gerührt, im Vakuum (0.5-1 Torr) eingengt und der erhaltene Rückstand über eine Kieselgelsäule chromatographiert (Kieselgel 60, Merck). Elution mit $\text{Me}_2\text{CO}/\text{MeOH}/\text{H}_2\text{O}$ zwischen 30:1:1 und 15:1:1 ergab 0.94 g (77%) des reinen Produktes. DC: $R_f=0.79$ in $\text{Me}_2\text{CO}/\text{MeOH}/\text{H}_2\text{O}$ 15:1:1 (Ninhydrin positiv, nach 5 min Behandlung der Platte mit HCl -Gas)
- 25 ^1H NMR-Spektrum in D_6 -DMSO (δ , ppm): 8.53 (t, 1H, $\text{NH}^{\text{Gly}3}$), 7.98 (t, 1H, CCH_2NH), 7.81 (t, 1H, $\text{NH}^{\text{Gly}2}$), 6.98 (t, 1H, $\text{NH}^{\text{Gly}1}$), 3.85 (d, 2H, J_{NH} 5.5 Hz, $\text{CH}_2^{\text{Gly}2}$), 3.73 (d, 2H, J_{NH} 5.5 Hz, $\text{CH}_2^{\text{Gly}3}$), 3.59 (d, 2H, J_{NH} 6 Hz, $\text{CH}_2^{\text{Gly}1}$), 2.69 (br. d, 2H, J_{NH} 6.5 Hz, CCH_2), 1.38 (s, 9H, OCMe_3). Massenspektrum: 1239 (M+Na).

Beispiel 5Poly-N-(2-Hydroxyethyl)-acrylamid mit 20% mol. 6SLN. (6SLN-PAA)

- 5 Zu einer Lösung von 1mg 6SLN-Gly ($1.37 \mu\text{M}$) aus Beispiel 1 in 0.1ml DMSO wurden 1.32 mg Poly(4-nitrophenylacrylat) ($6.84 \mu\text{M}$) und 7ml Et_3N in 0.132 ml DMF zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde bei 40°C inkubiert (der Verlauf der Konjugation wurde mittels DC verfolgt: Verschwinden des Fleckes des Zucker Eduktes), nach 24 h wurden $23\mu\text{l}$ Ethanolamin zugegeben. Nach weiteren 15 h bei
- 10 Raumtemperatur wurde die Reaktionslösung über eine Sephadex LH-20 Säule ($1.5 \times 25 \text{ cm}$, Eluent - Acetonitril/Wasser 1:1) chromatographiert. Die zuckerhaltige Fraktion wurde eingeeengt, in Wasser aufgenommen, eingefroren und lyophilisiert. Es wurden 1.6 mg des Konjugat erhalten (90%).

15 Beispiel 6Polyacrylsäure (Na^+ -salt) mit 20% mol. 6SLN

- Zu einer Lösung von 1 mg 6SLN-Gly ($1.37 \mu\text{M}$) in 0.1 ml of DMSO, wurde 1.32 mg Poly(4-nitrophenylacrylate) ($6.84 \mu\text{M}$) in 0.132 ml DMF und Et_3N ($7 \mu\text{l}$) zugesetzt. Das
- 20 Reaktionsgemisch wurde bei 40°C inkubiert (der Verlauf der Konjugation wurde mittels DC verfolgt: Verschwinden des Fleckes des Zucker Eduktes), nach 24 h wurden $230\mu\text{l}$ 0.1 M NaOH zugegeben. Nach 15 h bei Raumtemperatur wurden $15 \mu\text{l}$ 1M HCl zugegeben und das Reaktionsgemisch über eine Sephadex LH-20 Säule ($1.5 \times 25 \text{ cm}$, Eluent - Acetonitrile/Wasser 1:1) chromatographiert. Die zuckerhaltige Fraktion wurde
- 25 eingeeengt, in Wasser aufgenommen, eingefroren und lyophilisiert. Es wurden 1.5 mg Konjugat erhalten (93%).

Beispiel 7

{Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NHCO(CH₂)₄CO(NHCH₂CO)₃NHCH₂}₄C.

- 5 Eine Lösung von 1.2mg Tetrakis(N-tert-butyloxycarbonyl-triglycyl-amidomethyl)methan (1 μ M) aus Beispiel 4 in 0.1 ml CF₃COOH wurde bei Raumtemperatur gerührt. Nach 15 h wurde 1ml Toluol zugegeben und die Lösung eingengt. Der Rückstand wurde in 0.5 ml Wasser gelöst, es wurden 5 μ l konzentrierte HCl zugegeben, die Lösung eingengt und der Rückstand im Vakuum getrocknet. Das erhaltene Tetraamin wurde
- 10 in 0.2 ml DMF suspendiert, und eine Lösung von 4.9mg Neu5Ac α 2-6Gal β 1-4GlcNAc β 1-NHCOCH₂NHCO(CH₂)₄COO-p-C₆H₄NO₂ (5 μ M) in 0.3 ml DMF und 5 μ l NEt₃ wurde zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 15 h bei 20°C gerührt. Es wurden 10 μ l konzentrierte Ammoniak-Lösung zugegeben und nach einer Stunde wurde die Reaktionslösung über eine Sephadex G-50 (1.2x50 cm) gegeben (Eluent
- 15 0.05 M Ammoniak Lösung).
- Die zuckerhaltige Hauptfraktion wurde eingengt, in Wasser aufgenommen, eingefroren und lyophilisiert. Es wurden 2.9mg Konjugat erhalten(68%).

20 Beispiel 8

Anzucht der Influenza Viren, und Bestimmung der Inhibition der viralen Bindung an Fetuin

- Die nicht adaptierten menschlichen Influenza Viren A/England/157/83 M, A/NIB/12/89
- 25 M, A/NIB/23/89 M, A/NIB/50/89 M (H1N1), A/NIB/47/89 M, A/NIB/3/90 M, A/NIB/44/90 M (H3N2), B/England/222/82 M, B/NIB/48/90 M, and B/NIB/15/89 M wurden vom National Institute for Biological Standardisation and Control (NIBSC, Potters Bar/UK) erhalten, sie waren aus klinischen Proben isoliert und wurden ausschliesslich in MDCK Zellen gezüchtet.

Die in Hühnereiern gezüchteten Influenza Viren wurden von der Viren Stammsammlung des D.I.Ivanovsky Institutes für Virology, Moskau erhalten. Diese Viren wurden in 9-10 Tage alten embryonalen Hühnereiern inkubiert.

Für die Untersuchung der viralen Bindung, wurden die virushaltigen Kulturüberstände bzw. allantoische Flüssigkeiten durch Zentrifugation von etwaigen Zellbruchsstücken befreit. Diese Lösungen wurden ohne weitere Aufreinigung entweder sofort eingesetzt oder bis zu 4 Wochen bei 4°C gelagert.

Die Beschichtung der Mikrotiterplatten mit Rinderfetuin (Fluka, CH) wurden folgendermassen durchgeführt: Die Kavitäten einer 96er EIA Mikrotiterplatte aus Polystyrol(Flow, USA) wurden bei mit jeweils 0.1ml einer Fetuin Lösung in PBS (10 mg/ml) 2h bei 37°C inkubiert. Die Platte wurde mit einer Lösung 0.01% Tween 20 (Serva, D) in PBS und dann mit destillierten Wasser gewaschen, und entweder direkt verwenden, oder an der Luft getrocknet und bis zur Verwendung bei -20°C gelagert.

Um die Viren spezifisch an die Fetuin beschichteten Platten zu adsorbieren, wurden die viralen Kulturen mit PBS bis auf einen Hemagglutinin-Titer von 1:50-1:200 verdünnt. Die Platten wurden dann mit je 0.1ml dieser Lösung pro Kavität für 2 h bei 4°C inkubiert.

Die Inbition der Bindung des Meerrettich-Peroxidase-Fetuin Konjugates (hergestellt nach der Perjodat Aktivierungs Standardmethode) an die adsorbierten Viren wurde wie folgt bestimmt:

Die Platten wurden mit einer 0.01% Tween 20 Lösung in PBS gewaschen, dann wurden 0.1 ml einer 0.02 µM Lösung des Peroxidase-Fetuin Konjugates und gleichzeitig verschiedene Konzentration des zu testenden Inhibitors zugegeben. Nach einer Inkubationzeit von 1 h bei 4°C wurden die Platten mit einer kalten PBS/Tween Lösung gewaschen.

Die Peroxidase Aktivität wurde durch Zugabe von je 0.1 ml einer Substratlösung (0.4 mg/ml o-Phenylendiamin plus 0.02% H₂O₂ in 50 mM Natriumacetat Puffer, pH 5.5) bestimmt. Nach Zugabe der Substratlösung wurden die Platten 30 Minuten bei Raumtemperatur im Dunkeln inkubiert, dann wurden 0.05ml 5% H₂SO₄ zugegeben und die Absorbtion bei 492nm mit einem Titertek Multiscan reader (Flow, Finland) bestimmt.

Zur Bestimmung der unspezifischen Bindung, wurden auf jeder Platte einige Kavitäten ohne Zugabe von Viren inkubiert. Es wurde jeweils nur sehr geringe unspezifische Bindung gefunden (A_{492} Werte von 0.05-0.2).

Zur Bestimmung der maximalen Bindung A_{\max} wurde für jede einzelne Platte die

- 5 Bindung des Peroxidase-Fetuin-Konjugates ohne Inhibitor Zugabe gemessen.

Als weitere Kontrolle wurde jeder einzelnen Virus Stamm mit einem Peroxidase-Fetuin-Konjugat umgesetzt, welcher zuvor mit Neuraminidase aus *Vibrio cholerae* umgesetzt worden war: In allen Fällen verlor das Konjugat seine Affinität zu Viren, somit wurde

- 10 Sialyloligosaccharide bedingt ist.

Die Bindungs Affinität wurde nach der folgenden Formel berechnet:

$$K_{\text{aff}} = \frac{C_i \times A_i (A_{\max} - A_0)}{A_{\max} (A_i - A_0)}$$

15

- hierbei ist K_{aff} die Dissoziationskonstante des Virus-Inhibitor Komplexes; A_{\max} ist die gemessene Absorption in Abwesenheit des Inhibitors; C_i und A_i sind die eingesetzte Inhibitor Konzentration und die entsprechende gemessene Absorption; A_0 ist die bei
- 20 Sättigung an Inhibitor gemessene Absorption.

Die Ergebnisse der Inhibition der viralen Zelladhäsion des neuen Konjugates 6SLN-PAA aus Beispiel 5 sind in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2:

Inhibition der viralen Zelladhäsion von Influenza Viren durch Sialosid Inhibitoren. Die Literaturdaten wurden zusammengefasst, wobei jeweils die höchste genannte inhibitorische Aktivität aufgeführt wird. Die Aktivität wird ausgedrückt in μM

- 5 Konzentration an Neu5Ac Gruppen des Inhibitors, welche eine 50% Inhibition verursachen.

Verwendete Testsysteme: Inhibition der Hemagglutination (HAI), Inhibition der Virus Adsorption an Erythrocyten (AI), Verringerung der viralen Vermehrung in Zellkulturen (MI), Verringerung der viralen Bindung an Fetuin (FBI).

- 10 Zum Vergleich sind zuunterst die Daten der Verbindung 6SLN-PAA aus Beispiel 5 aufgeführt.

Verbindungstyp	Test	μM Neu5Ac-Gruppen, bei 50% Inhibition	Referenz
15 Bivalente Sialoside	HAI	30 (X31)	Glick & Knowles, 1991
	HAI	180 (X31)	Sabesan et al., 1992
Cluster Sialoside	HAI	20 (X31)	Roy et al., 1993
Liposomale Sialoside	HAI	0.02 (X31)	Kingery-Wood et al, 1992
	HAI	0.33 (unknown)	Spevak et al., 1993
20 Sialylpolymere	FBI	0.3 (A/TX/77, A/BK/79)	Matrosovich et al, 1990
	HAI	0.2 (X31)	Spaltestein & Whitesides, 1991
	HAI	0.1 (X31)	Sparks et al., 1993
	HAI	0.2 (X31)	Lees et al., 1994
	25 MI	0.02 (X31, H3N2)	Itoh et al., 1995
		5 (WSN/33, H1N1)	Itoh et al., 1995
	FBI	> 400 (SG/57, H2N2)	Itoh et al., 1995
		> 50 (X31, H3N2)	Mochalova et al, 1994
		0.03 (USSR/85, H3N2)	Mochalova et al, 1994
		10 (Chile/83, H1N1)	Mochalova et al, 1994
30	MI	10 (B/USSR/83)	Mochalova et al, 1994
		> 8 (X31, H3N2)	Mochalova et al, 1994
		0.2 (USSR/85, H3N2)	Mochalova et al, 1994
		4 (Chile/83, H1N1)	Mochalova et al, 1994
	HAI	> 8 (B/USSR/83)	Mochalova et al, 1994
		0.001 (X31, H3N2)	Mamen et al, 1995
40 6SLN-PAA wie in Beispiel 5 der vorliegenden Erfindung beschrieben	FBI	0.02 (A/NIB/23/89M, H1N1)	
		0.01 (A/NIB/44/90M, H3N2)	
		0.02 (B/NIB/15/89M)	

Literatur

Bovin, N.V., Byramova, N.E., Tuzikov, A.B., Matrosovich, M.N., Mochalova, L.V., and Gambaryan, A.S. (1992) Viral attachment inhibitors, Patent PCT No.

5 PCT/US92/09745.

Byramova, N.E., Mochalova, L.V., Belyanchikov, I.M., Matrosovich, M.N., and Bovin, N.V. (1991) Synthesis of sialic acid pseudopolysaccharides by coupling of spacer-connected Neu5Ac with activated polymer. *J.Carbohydr.Chem.* 10, 691-700.

10 Fleischer, E.B., Gebala, A.E., Levey, A., Tasker, P.A. (1971). Conversion of aliphatic and alicyclic polyalcohols to the corresponding primary polyamines. *J.Organic Chem.*, Vol. 36, No. 20, 3042-3044.

Gambaryan, A.S. and Matrosovich, M.N. (1992) A solid-phase enzyme-linked assay for influenza virus receptor-binding activity. *J.Virol.Methods*, 39, 111-123.

15 Glick, G.D., and Knowles, J.R. (1991). Molecular recognition of bivalent sialosides by influenza virus. *J.Amer.Chem.Soc.* 113, 4701-4703.

Gottschalk, A., Belyavin, G., Biddle, F. (1972). Glycoproteins as influenza virus haemagglutinin inhibitors and as cellular virus receptors. In "Glycoproteins. Their composition, structure and function", (A.Gottschalk, Ed.), 2-d edition, part B, pp.1082-1096. Elsevier Publishing Company, Amsterdam-London-New-York.

20 Itoh, M., Hetterich, P., Isecke, R., Brossmer, R., and Klenk, H.-D. (1995). Supression of influenza virus infection by an N-thioacetylneuraminic acid acrylamide copolymer resistant to neuraminidase. *Virology* 212, 340-347 (1995).

Kingery-Wood, J.E., Williams, K.W., Sigal, G.B., and Whitesides, G.M., (1992). The agglutination of erythrocytes by influenza virus is strongly inhibited by liposomes incorporating an analog of sialyl gangliosides. *J.Amer.Chem.Soc.* 114, 7303-7305.

Krizanova, O., and Ratnova, V. (1969). Serum inhibitors of myxoviruses. *Curr.Top.Microbiol.Immunol.* 47, 125-151.

25 Lees, W.J., Spaltenstein, A., Kingery-Wood, J.E., and Whitesides, G.M. (1994). Polyacrylamides bearing pendant a-sialoside groups strongly inhibit agglutination of erythrocytes by influenza A virus: multivalency and steric stabilization of particulate biological systems. *J.Med.Chem.* 37, 3419-3433.

Likhoshesterov, L.M., Novikova, O.S., Derevitskaja, V.A., Kochetkov, N.K. (1986). A new simple synthesis of amino sugar b-D-glycosylamines. Carbohydrate Research, 146, C1-C5.

5 Mammen, M., Dahmann, G., Whitesides, G.M. (1995) Effective inhibitors of hemagglutination by influenza virus synthesized from polymers having active ester groups. Insight into mechanism of inhibition. J.Med.Chem., 38, 4179-4190.

Manger, I.D., Rademacher, T.W., Dwek, R.A. (1992). 1-N-Glycyl b-oligosaccharide derivatives as stable intermediates for the formation of glycoconjugate probes. Biochemistry, 31, 10724-10732.

10 Matrosovich, M.N., Mochalova, L.V., Marinina, V.P., Byramova, N.E., and Bovin, N.V. (1990). Synthetic polymeric sialoside inhibitors of the influenza virus receptor-binding activity. FEBS Letters 272, 209-212.

15 Matrosovich M.N., Gambaryan A.S., Tuzikov A.B., Byramova N.E., Mochalova L.V., Golbraikh A.A., Shenderovich M.D., Finne J., and Bovin, N.V. (1993). Probing of the receptor-binding sites of the H1 and H3 influenza A and influenza B virus hemagglutinins by synthetic and natural sialosides. Virology 196, 111-121.

Mochalova, L.V., Tuzikov, A.B., Marinina, V.P., Gambaryan, A.S., Byramova, N.E., Bovin, N.V., and Matrosovich, M.N. (1994) Synthetic polymeric inhibitors of influenza virus receptor-binding activity suppress virus replication. Antiviral Research 20 23, 179-190.

Robertson, J.S. (1993). Clinical influenza virus and the embryonated hen's egg. Rev.Med.Virol. 3, 97-106.

Roy, R., and Laferriere, C.A. (1988). Synthesis of antigenic copolymers of N-acetyl-neuraminic acid and their binding to wheat germ agglutinin and antibodies.

25 Carbohydr.Res. 177, c1-c4.

Roy, R., Zanini, D., Meunier, S.J., and Romanowska, A. (1993). Solid-phase synthesis of dendritic sialoside inhibitors of influenza A virus hemagglutinin. J.Chem.Soc., Chem. Commun. 1993, 1869-1872.


30 Sabesan, S., Duus, J.O., Neira, S., Domaille, P., Kelm, S., Paulson, J.C., and Bock, K. (1992). Cluster sialoside inhibitors for influenza virus: synthesis, NMR, and biological studies. J.Amer.Chem.Soc. 114, 8363-8375.

- Sauter, N.K., Hanson, J.E., Glick, G.D., Brown, J.H., Crowther, R.L., Park, S.-J., Skehel, J.J., and Wiley, D.C. (1992) Binding of influenza virus hemagglutinin to analogs of its cell-surface receptor, sialic acid: analysis by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy and X-ray crystallography. *Biochemistry* 31, 9609-9621.
- 5 Spaltenstein, A., and Whitesides, G.M. (1991). Polyacryamides bearing pendant a-sialoside groups strongly inhibit agglutination of erythrocytes by influenza virus. *J.Amer.Chem.Soc.* 113, 686-687.
- Spevak, W., Nagy, J.O., Charych, D.H., Schaefer, M.E., Gilbert, J.H., and Bednarski, M.D. (1993). Polymerized liposomes containing C-glycosides of sialic acid: 10 potent inhibitors of influenza virus in vitro infectivity. *J.Amer.Chem.Soc.* 115, 1146-1147.
- Toogood, P.L., Galliker, P.K., Glick, G.D. and Knowles, J.R. (1991) Monovalent sialosides that bind tightly to influenza A virus. *J.Med.Chem.* 34, 3138-3140.
- Watowich, S.J., Skehel, J.J., and Wiley, D.C. (1994) Crystal structures of 15 influenza virus hemagglutinin in complex with high-affinity receptor analogs. *Structure* 2, 719-731.
- Weinhold, E.G. and Knowles, J.R. (1992) Design and evaluation of a tightly binding fluorescent ligand for influenza A hemagglutinin. *J.Am.Chem.Soc.* 114, 9270-9275.
- 20 Wiley, D.C. and Skehel, J.J. (1987) The structure and function of the hemagglutinin membrane glycoprotein of influenza virus. *Ann.Rev.Biochem.* 56, 365-394.

Patentanspruch

1. Verbindungen der allgemeinen Formel,

5



worin R¹ - eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet;

- 10 R² - H, Hydroxyl, Z-Alkyl, substituiertes Z-Alkyl, Z-Aryl, substituiertes Z-Aryl bedeutet, und Z - O, S oder NH entspricht;

R³ - eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet;

- 15 R⁴ - H oder Acyl darstellt;

X - O, S oder ein lineares C₁-C₄ Alkyl bedeutet;

Y - NH, O, S, CH₂, oder ein Zucker ist;

W - ein bifunktionseller Spacer ist;


- 20 P - ein multivalenter Träger bestehend aus einem der nachfolgenden Stoffe ist:
 Polyacrylat, Polyacrylamid, N-substituiertes Polyacrylamid, Metacrylamid, N-substituiertes Metacrylamid, Polyacrylsäure, Polycarbonat, Polyester, Polyamid, Polyanhydrid, Polyiminocarbonat, Polyorthoester, Polydioxanon, Polyphosphazen, Polyhydroxycarbonsäure, Polyaminosäure, Polysaccharid, Protein, Dextran, Chitosan,
 25 Glucan, Liposom, Micropartikel.

2. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der multivalente Träger $C(CH_2NH-A_n-)_4$ darstellt, worin A eine neutrale oder negativ geladene Aminosäure ist.
- 5 3. Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 worin P mit Biotin, einem Farbstoff, einem Fluoreszenzfarbstoff oder einem radioaktiven Marker markiert ist.
4. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur
10 Bindung an Viren.
5. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur Bindung an Influenza Viren.
- 15 6. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur Bindung an menschliche Influenza Viren.
7. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß dem Anspruch 3 als Komponenten von Testsystemen zum Screenen von Inhibitoren der viralen
20 Zelladhäsion.
8. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur Bindung an Hemagglutinin von Influenza Viren.
- 25 9. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 als Inhibitoren der viralen Zelladhäsion an natürliche Rezeptoren.
10. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 4-9 in Kombination mit Neuraminidase-Inhibitoren.
- 30 11. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur prophylaktischen oder therapeutischen Behandlung viraler Infektionen.

12. Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 und 2 zur prophylaktischen oder therapeutischen Behandlung viraler Infektionen in Kombination mit Neuraminidase-Inhibitoren.

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



<p>(51) Internationale Patentklassifikation 6 : A61K 47/48</p>	<p>A3</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/14215</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. April 1998 (09.04.98)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/05389</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 1. Oktober 1997 (01.10.97)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 196 40 791.5 2. Oktober 1996 (02.10.96) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SYN- TESOME GESELLSCHAFT FÜR MED. BIOCHEMIE M.B.H. [DE/DE]; Heimdallstrasse 4; D-81739 München (DE).</p> <p>(71)(72) Anmelder und Erfinder: BOVIN, Nikolai [RU/RU]; Artsimovicha strasse 11-181, Moscow, 117871 (RU). MATROSOVICH, Mikhail [RU/RU]; Ramenka strasse 9/2-287, Moscow, 117607 (RU). TUZIKOV, Alexandr [RU/RU]; Ismaylovski strasse 47-4, Moscow, 105037 (RU). CHINAREV, Alexandr [RU/RU]; Miklukho-Maklaya strasse 16/10, Moscow, 117871 (RU). GAMBARYAN, Alexandra [RU/RU]; Vargy strasse 40-71, Moscow, 117133 (RU). ROBERTSON, James [GB/GB]; Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, Hertfordshire EN6 3QG (GB).</p>	<p>(74) Gemeinsamer Vertreter: SYNTESOME GESELLSCHAFT FÜR MED. BIOCHEMIE M.B.H.; Heimdallstrasse 4, D-81739 München (DE).</p> <p>(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</p> <p>(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe- richts: 20. August 1998 (20.08.98)</p>	
<p>(54) Title: GLYCOCONJUGATES AS VIRUS CELL ADHESION INHIBITORS</p> <p>(54) Bezeichnung: GLYKONJUGATE ALS INHIBITOREN DER VIRALEN ZELLADHÄSION</p>		
 <p style="text-align: right;">(1)</p>		
<p>(57) Abstract</p> <p>The host-cell adhesion by human influenza viruses is inhibited by new compounds of the general formula (1), where R¹ stands for acyl or a thioacyl group; R² for hydroxyl, Z-alkyl, substituted Z-alkyl, Z-aryl, substituted Z-aryl, and Z corresponds to O, S or NH; R³ stands for an acyl or a thioacyl group; R⁴ for H or acyl; X for O, S, SH₂ or a sugar; and where W is a bifunctional spacer and P a multivalent vector consisting of one of the following substances: polyacrylate, polyacrylamide, N-substituted polyacrylamide, metacrylamide, N-substituted metacrylamide, polyacrylic acid, polycarbonate, polyester, polyamide, polyanhydride, polyiminocarbonate, polyorthoester, polydioxanone, polyphosphazene, polyhydroxy carboxylic acid, polyamino acid, polysaccharide, protein, dextran, chitosan, glucan, liposome, microparticles. The inventive compounds are capable of bonding authentic human viruses from the A (H1 and H3) groups, which have not been adapted through culturing in chicken eggs.</p>		

(57) Zusammenfassung

Die Adhäsion menschlicher Influenza Viren an Wirtszellen wird durch neue Verbindungen der allgemeinen Formel (1) inhibiert worin, R¹ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet; R² H, Hydroxyl, Z-Alkyl, substituiertes Z-Alkyl, Z-Aryl, substituiertes Z-Aryl bedeutet, und Z O, S oder NH entspricht; R³ eine Acyl oder Thioacylgruppe bedeutet; R⁴ H oder Acyl darstellt; X O, S oder ein lineares C₁-C₄ Alkyl bedeutet; Y NH, O, S, CH₂ oder ein Zucker ist; W ein bifunktionaler Spacer ist P ein multivalenter Träger bestehend aus einem der nachfolgenden Stoffe ist: Polyacrylat, Polyacrylamid, N-substituiertes Polyacrylamid, Metacrylamid, N-substituiertes Metacrylamid, Polyacrylsäure, Polycarbonat, Polyester, Polyamid, Polyanhydrid, Polyiminocarbonat, Polyorthoester, Polydioxanon, Polyphosphazen, Polyhydroxycarbonsäure, Polyaminosäure, Polysaccharid, Protein, Dextran, Chitosan, Glucan, Liposom, Micropartikel. Die neuen Verbindungen binden authentische, nicht durch Anzucht in Hühnereiern adaptierte menschliche Viren der Typen A (H1 und H3) und B.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 97/05389

A. CLASSIFICATION F SUBJECT MATTER
IPC 6 A61K47/48

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 94 11005 A (SCIENT DIMENSIONS INC ;BOVIN NICOLAI V (RU); BYRAMOVA NARGIZ E (RU) 26 May 1994 cited in the application	
P,X	--- GAMBARYAN, A. S. ET AL: "Specification of receptor-binding phenotypes of influenza virus isolates from different hosts using synthetic sialylglycopolymers: non-egg-adapted human H1 and H3 influenza A and influenza B viruses share a common high binding affinity for 6'- sialyl (N- acetyllactosamine)" VIROLOGY (1997), 232(2), 345-350 CODEN: VIRLAX;ISSN: 0042-6822, 1997, XP002068479 see abstract --- -/-	1-12



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

*** Special categories of cited documents :**

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 June 1998

Date of mailing of the international search report

08. 07. 1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Berte, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 97/05389

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	UNVERZAGT, CARLO ET AL: "Chemical and enzymic synthesis of multivalent sialoglycopeptides" CARBOHYDR. RES. (1994), 251, 285-301 CODEN: CRBRAT;ISSN: 0008-6215, 1994, XP002068480	1
Y	see page 291, column 1 see abstract	1-12
P,X	--- CHOI, SEOK-KI ET AL: "Generation and in Situ Evaluation of Libraries of Poly(acrylic acid) Presenting Sialosides as Side Chains as Polyvalent Inhibitors of Influenza-Mediated Hemagglutination" J. AM. CHEM. SOC. (1997), 119(18), 4103-4111 CODEN: JACSAT;ISSN: 0002-7863, May 1997, XP002068481	1-12
P,Y	see the whole document	1-12
A	--- CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 97, no. 13, 27 September 1982 Columbus, Ohio, US; abstract no. 106070, CORFIELD, ANTHONY P. ET AL: "The specificity of viral sialidases. The use of oligosaccharide substrates to probe enzymic characteristics and strain-specific differences" XP002068482 see abstract & EUR. J. BIOCHEM. (1982), 124(3), 521-5 CODEN: EJBCAI;ISSN: 0014-2956, 1982,	1
X	--- CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 121, no. 15, 10 October 1994 Columbus, Ohio, US; abstract no. 180061, NISHIMURA, SHINICHIRO ET AL: "Chemoenzymic preparation of a glycoconjugate polymer having a sialyloligosaccharide: Neu5Ac.alpha.(2.fwdarw.3)Gal.beta.(1.fwdarw.4)GlcNAc" XP002068483 see abstract & BIOCHEM. BIOPHYS. RES. COMMUN. (1994), 199(1), 249-54 CODEN: BBRC9;ISSN: 0006-291X, 1994,	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP 97/05389

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.: 1-12
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See supplement sheet ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

Claims 1-12

Owing to the large number of compounds which are theoretically defined in the independent claims, the search had to be limited for economic reasons. The research was restricted to the substances supported by pharmacological data and/or the specific compounds to which claim was laid, in addition to the underlying ideas of the present application (see Guidelines, Chapter III, paragraph 2.3).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP 97/05389

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9411005 A	26-05-1994	US 5571836 A AU 3177493 A	05-11-1996 08-06-1994

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/05389

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 A61K47/48

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 94 11005 A (SCIENT DIMENSIONS INC ;BOVIN NICOLAI V (RU); BYRAMOVA NARGIZ E (RU) 26.Mai 1994 in der Anmeldung erwähnt ---	
P,X	GAMBARYAN, A. S. ET AL: "Specification of receptor-binding phenotypes of influenza virus isolates from different hosts using synthetic sialylglycopolymers: non-egg-adapted human H1 and H3 influenza A and influenza B viruses share a common high binding affinity for 6'- sialyl (N- acetylactosamine)" VIROLOGY (1997), 232(2), 345-350 CODEN: VIRLAX;ISSN: 0042-6822, 1997, XP002068479 siehe Zusammenfassung --- --/--	1-12

<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>* "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>* "E" Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>* "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>* "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>* "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p>	<p>* "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>* "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>* "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>* "Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
18. Juni 1998	08. 07. 1998
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Berte, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/05389

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	UNVERZAGT, CARLO ET AL: "Chemical and enzymic synthesis of multivalent sialoglycopeptides" CARBOHYDR. RES. (1994), 251, 285-301 CODEN: CRBRAT;ISSN: 0008-6215, 1994, XP002068480	1
Y	siehe Seite 291, Spalte 1 siehe Zusammenfassung ---	1-12
P,X	CHOI, SEOK-KI ET AL: "Generation and in Situ Evaluation of Libraries of Poly(acrylic acid) Presenting Sialosides as Side Chains as Polyvalent Inhibitors of Influenza-Mediated Hemagglutination" J. AM. CHEM. SOC. (1997), 119(18), 4103-4111 CODEN: JACSAT;ISSN: 0002-7863, Mai 1997, XP002068481	1-12
P,Y	siehe das ganze Dokument ---	1-12
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 97, no. 13, 27.September 1982 Columbus, Ohio, US; abstract no. 106070, CORFIELD, ANTHONY P. ET AL: "The specificity of viral sialidases. The use of oligosaccharide substrates to probe enzymic characteristics and strain-specific differences" XP002068482 siehe Zusammenfassung & EUR. J. BIOCHEM. (1982), 124(3), 521-5 CODEN: EJBCAI;ISSN: 0014-2956, 1982, ---	1
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 121, no. 15, 10.Oktober 1994 Columbus, Ohio, US; abstract no. 180061, NISHIMURA, SHINICHIRO ET AL: "Chemoenzymic preparation of a glycoconjugate polymer having a sialyloligosaccharide: Neu5Ac.alpha.(2.fwdarw.3)Gal.beta.(1.fwdarw.4)GlcNAc" XP002068483 siehe Zusammenfassung & BIOCHEM. BIOPHYS. RES. COMMUN. (1994), 199(1), 249-54 CODEN: BBRCA9;ISSN: 0006-291X, 1994, -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 97/05389

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☒ Ansprüche Nr. 1-12
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen enthalten:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Ansprüche Nr.: 1-12

Wegen der großen Zahl der Verbindungen, die in den unabhängigen Ansprüchen theoretisch definiert werden, mußte die Recherche aus ökonomischen Gründen eingeschränkt werden. Die Recherche beschränkte sich auf die durch pharmakologische Daten gestützte Substanzen und/oder auf die spezifisch beanspruchte Verbindungen, sowie auf den unterliegenden Gedanken der vorliegenden Anmeldung. (Siehe Richtlinien, Kapitel III, Paragraph 2.3).

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/05389

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9411005 A	26-05-1994	US 5571836 A	05-11-1996
		AU 3177493 A	08-06-1994
